

LEGENDA

ALLUVIONI FLUVIALI (a) Recenti e attuali: Ciottoli carbonatici di dimensioni variabili in matrice sabbioso-limosa giallo-brunastra.

DETRITO DI FALDA (df) Pleistocene medio-superiore: Breccie ad elementi carbonatici con matrice carbonatica a granulometria sabbiosa.

F.NE RAGUSA M.BO IRMINIO (Mcm) - Burdigaliano sup. - Langhiano inf.: calcareniti grigiaine alternate a strati calcareo-marnosi. Spessore fino a 60 metri.

F.NE RAGUSA M.BO IRMINIO (Mc) - Aquitaniano - Burdigaliano inf.:Calcareniti e calciruditi bianco-grigiaine in banchi di spessore fino a 10 metri separati da sottili livelli marnoso-sabbiosi.

F.NE RAGUSA M.BO LEONARDO (Ocm) - Oligocene superiore: Alternanza di calcilutiti e marne e calcari marnosi.Spessore non inferiore a 100 metri.

Faglia (I trattini indicano la parte ribassata)

Faglia presunta (I trattini indicano la parte ribassata)

giaciture orizzontali

giaciture 10° - 45°

COMUNE DI RAGUSA

COMUNE DI RAGUSA

PIANO REGOLATORE DI RAGUSA

SOGGETTI ATTUATORI:
COMUNE DI RAGUSA

IL R.U.P.
ARCH. MARCELLO DIMARTINO

IL TECNICO INCARICATO
GEOL. SARO DI RAIMONDO

STUDIO GEOLOGICO ELABORATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE A.R.T.A. SICILIA N°.3 DEL 20/06/2014

UBICAZIONE:
AREE RICADENTI NELLA C.T.R. 647120

TAVOLA

N22

SCALA 1:10000

FASE PRELIMINARE (A1)
CARTOGRAFIE DI ANALISI (A1c)

ELABORATO :
CARTA GEOLOGICA

C.T.R. 1:10.000 n° 647120 "Villa Cammarana"